



DOSNYCKEL

Höstsäd

För anpassad ogräsbekämpning

Dosnyckel

(finns även på webbutiken.jordbruksverket.se)

För att dosnyckeln ska vara användbar krävs att

- **sprutan uppfyller kraven vid funktionstest.**
- **preparat väljs efter vilka ogräs som förekommer.**

Funktionstest

De viktigaste kraven vid funktionstestet gäller vätskefördelning, omrörning, manometer och kalibrering.

Välj preparat efter vilka ogräs som förekommer

Ogräsarterna kan bestämmas med hjälp av boken "Ogräs på åker och i trädgård", Natur och Kultur, eller bildarkivet på www.jordbruksverket.se/ograsedatabas.

Anteckna ogräsarterna i växtodlingsplanen.

Val av preparat kan göras med hjälp av "Ogräsdatabasen" på www.jordbruksverket.se/ograsedatabas eller Jordbruksverkets publikation "Kemisk ogräsbekämpning".

Dosrekommendationer

På preparatets etikett anges ofta ett dosintervall. Rekommendationerna i dosnyckeln utgår från den högre dosen som normalt ger över 85 procent effekt.

Dosnyckeln rekommenderar den dos som ger en tillräckligt hög effekt för att förhindra att ogräsmängden ökar på sikt och som beräknas ge det bästa ekonomiska utbytet.

Lämna alltid en obehandlad yta för kontroll av effekten.

Observera att tillverkarna av preparatet inte ansvarar för användning utanför etikettens rekommendationer!

Dosnyckeln har utvecklets av B. Jennéus, Jordbruksverket och G. Gummesson, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Upplaga 6, framtagen av Jordbruksverket, Rådgivningsenheterna. Tryckt 2018.

Kontakt: vaxtskydd@jordbruksverket.se

Höstsäd

Skifte.....

För anpassad bekämpning av **örtogräs** på våren

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid spruttillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

	Poäng	Antal poäng
1. Gröda		
Höstråg	1	—
Rågvede/höstkorn	3	—
Höstvede:		
långstråig sort, t.ex. Kosack, Olivin	5	—
kortstråig sort, t.ex. Audi, Boomer, Elvis, Harnesk, Kranich, Loyal	8	—
2. Grödans konkurrensförmåga		
Bättre än normal (grödan är jämn och tät)	1	—
Normal	3	—
Sämlre än normal (grödan är ojämn och luckig)	6	—
3. Ogräsmängd		
Liten (0–1 planta under en handflata)	1	—
Måttlig	3	—
Stor (minst 3 plantor under en handflata)	5	—
4. Ogräsarternas konkurrensförmåga		
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, plister, veronika, viol)	1	—
Måttlig (både lågvuxna och högvuxna arter)	2	—
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrå, blåklint, dån, lomme, snärjmåra, vallmo)	4	—

5. Ogrässets utveckling vid bekämpning

Små plantor, lägre än 4 cm (tidig bekämpning)	1	—
Medelstora plantor	3	—
Stora plantor, högre än 8 cm (sen bekämpning)	5	—

6. Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning

Bättre än normalt (över 14 °C, god markfukt)	1	—
Normala	3	—
Sämre än normalt (under 10 °C, torra)	5	—

7. Väderlek under bekämpningsdagen

Fuktigt, varmt	1	—
Torr, varmt	2	—
Fuktigt, kallt	3	—
Torr, kallt	4	—

Totalt antal poäng _____

DOSREKOMMENDATION

Antal poäng	Procent av normal dos
28 eller mer	100
23 – 27	75
18 – 22	50
17 eller mindre	25

Anteckningar

Dominerande ogräsarter:

Preparat och dos:

Datum för bekämpning:

Sprutförare:

Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):

.....

Höstsäd

Skifte.....

För anpassad bekämpning av **örtogräs** på våren

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid spruttillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

	Poäng	Antal poäng
1. Gröda		
Höstråg	1	—
Rågvete/höstkorn	3	—
Höstvete:		
långstråig sort, t.ex. Kosack, Olivin	5	—
kortstråig sort, t.ex. Audi, Boomer, Elvis, Harnesk, Kranich, Loyal	8	—
2. Grödans konkurrensförmåga		
Bättre än normal (grödan är jämn och tät)	1	—
Normal	3	—
Sämlre än normal (grödan är ojämn och luckig)	6	—
3. Ogräsmängd		
Liten (0–1 planta under en handflata)	1	—
Måttlig	3	—
Stor (minst 3 plantor under en handflata)	5	—
4. Ogräsarternas konkurrensförmåga		
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, plister, veronika, viol)	1	—
Måttlig (både lågvuxna och högvuxna arter)	2	—
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrå, blåklint, dån, lomme, snärjmåra, vallmo)	4	—

5. Ogrässets utveckling vid bekämpning

Små plantor, lägre än 4 cm (tidig bekämpning)	1	—
Medelstora plantor	3	—
Stora plantor, högre än 8 cm (sen bekämpning)	5	—

6. Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning

Bättre än normalt (över 14 °C, god markfukt)	1	—
Normala	3	—
Sämre än normalt (under 10 °C, torra)	5	—

7. Väderlek under bekämpningsdagen

Fuktigt, varmt	1	—
Torr, varmt	2	—
Fuktigt, kallt	3	—
Torr, kallt	4	—

Totalt antal poäng _____

DOSREKOMMENDATION

Antal poäng	Procent av normal dos
28 eller mer	100
23 – 27	75
18 – 22	50
17 eller mindre	25

Anteckningar

Dominerande ogräsarter:

Preparat och dos:

Datum för bekämpning:

Sprutförare:

Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):
.....

Höstsäd

Skifte.....

För anpassad bekämpning av **örtogräs** på våren

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid spruttillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

	Poäng	Antal poäng
1. Gröda		
Höstråg	1	—
Rågvete/höstkorn	3	—
Höstvete:		
långstråig sort, t.ex. Kosack, Olivin	5	—
kortstråig sort, t.ex. Audi, Boomer, Elvis, Harnesk, Kranich, Loyal	8	—
2. Grödans konkurrensförmåga		
Bättre än normal (grödan är jämn och tät)	1	—
Normal	3	—
Sämrre än normal (grödan är ojämn och luckig)	6	—
3. Ogräsmängd		
Liten (0–1 planta under en handflata)	1	—
Måttlig	3	—
Stor (minst 3 plantor under en handflata)	5	—
4. Ogräsarternas konkurrensförmåga		
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, plister, veronika, viol)	1	—
Måttlig (både lågvuxna och högvuxna arter)	2	—
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrå, blåklint, dån, lomme, snärjmåra, vallmo)	4	—

5. Ogrässets utveckling vid bekämpning

Små plantor, lägre än 4 cm (tidig bekämpning)	1	—
Medelstora plantor	3	—
Stora plantor, högre än 8 cm (sen bekämpning)	5	—

6. Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning

Bättre än normalt (över 14 °C, god markfukt)	1	—
Normala	3	—
Sämre än normalt (under 10 °C, torra)	5	—

7. Väderlek under bekämpningsdagen

Fuktigt, varmt	1	—
Torr, varmt	2	—
Fuktigt, kallt	3	—
Torr, kallt	4	—

Totalt antal poäng _____

DOSREKOMMENDATION

Antal poäng	Procent av normal dos
28 eller mer	100
23 – 27	75
18 – 22	50
17 eller mindre	25

Anteckningar

Dominerande ogräsarter:

Preparat och dos:

Datum för bekämpning:

Sprutförare:

Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):

.....

Höstsäd

Skifte.....

För anpassad bekämpning av **örtogräs** på våren

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid spruttillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

	Poäng	Antal poäng
1. Gröda		
Höstråg	1	—
Rågvede/höstkorn	3	—
Höstvede:		
långstråig sort, t.ex. Kosack, Olivin	5	—
kortstråig sort, t.ex. Audi, Boomer, Elvis, Harnesk, Kranich, Loyal	8	—
2. Grödans konkurrensförmåga		
Bättre än normal (grödan är jämn och tät)	1	—
Normal	3	—
Sämlre än normal (grödan är ojämn och luckig)	6	—
3. Ogräsmängd		
Liten (0–1 planta under en handflata)	1	—
Måttlig	3	—
Stor (minst 3 plantor under en handflata)	5	—
4. Ogräsarternas konkurrensförmåga		
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, plister, veronika, viol)	1	—
Måttlig (både lågvuxna och högvuxna arter)	2	—
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrå, blåklint, dån, lomme, snärjmåra, vallmo)	4	—

5. Ogrässets utveckling vid bekämpning

Små plantor, lägre än 4 cm (tidig bekämpning)	1	—
Medelstora plantor	3	—
Stora plantor, högre än 8 cm (sen bekämpning)	5	—

6. Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning

Bättre än normalt (över 14 °C, god markfukt)	1	—
Normala	3	—
Sämre än normalt (under 10 °C, torra)	5	—

7. Väderlek under bekämpningsdagen

Fuktigt, varmt	1	—
Torr, varmt	2	—
Fuktigt, kallt	3	—
Torr, kallt	4	—

Totalt antal poäng _____

DOSREKOMMENDATION

Antal poäng	Procent av normal dos
28 eller mer	100
23 – 27	75
18 – 22	50
17 eller mindre	25

Anteckningar

Dominerande ogräsarter:

Preparat och dos:

Datum för bekämpning:

Sprutförare:

Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):
.....

Höstsäd

Skifte.....

För anpassad bekämpning av **örtogräs** på våren

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid spruttillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

	Poäng	Antal poäng
1. Gröda		
Höstråg	1	—
Rågvete/höstkorn	3	—
Höstvete:		
långstråig sort, t.ex. Kosack, Olivin	5	—
kortstråig sort, t.ex. Audi, Boomer, Elvis, Harnesk, Kranich, Loyal	8	—
2. Grödans konkurrensförmåga		
Bättre än normal (grödan är jämn och tät)	1	—
Normal	3	—
Sämlre än normal (grödan är ojämn och luckig)	6	—
3. Ogräsmängd		
Liten (0–1 planta under en handflata)	1	—
Måttlig	3	—
Stor (minst 3 plantor under en handflata)	5	—
4. Ogräsarternas konkurrensförmåga		
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, plister, veronika, viol)	1	—
Måttlig (både lågvuxna och högvuxna arter)	2	—
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrå, blåklint, dån, lomme, snärjmåra, vallmo)	4	—

5. Ogrässets utveckling vid bekämpning

Små plantor, lägre än 4 cm (tidig bekämpning)	1	—
Medelstora plantor	3	—
Stora plantor, högre än 8 cm (sen bekämpning)	5	—

6. Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning

Bättre än normalt (över 14 °C, god markfukt)	1	—
Normala	3	—
Sämre än normalt (under 10 °C, torra)	5	—

7. Väderlek under bekämpningsdagen

Fuktigt, varmt	1	—
Torr, varmt	2	—
Fuktigt, kallt	3	—
Torr, kallt	4	—

Totalt antal poäng _____

DOSREKOMMENDATION

Antal poäng	Procent av normal dos
28 eller mer	100
23 – 27	75
18 – 22	50
17 eller mindre	25

Anteckningar

Dominerande ogräsarter:

Preparat och dos:

Datum för bekämpning:

Sprutförare:

Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):

.....

Höstsäd

Skifte.....

För anpassad bekämpning av **örtogräs** på våren

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid spruttillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

	Poäng	Antal poäng
1. Gröda		
Höstråg	1	—
Rågvete/höstkorn	3	—
Höstvete:		
långstråig sort, t.ex. Kosack, Olivin	5	—
kortstråig sort, t.ex. Audi, Boomer, Elvis, Harnesk, Kranich, Loyal	8	—
2. Grödans konkurrensförmåga		
Bättre än normal (grödan är jämn och tät)	1	—
Normal	3	—
Sämrre än normal (grödan är ojämn och luckig)	6	—
3. Ogräsmängd		
Liten (0–1 planta under en handflata)	1	—
Måttlig	3	—
Stor (minst 3 plantor under en handflata)	5	—
4. Ogräsarternas konkurrensförmåga		
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, plister, veronika, viol)	1	—
Måttlig (både lågvuxna och högvuxna arter)	2	—
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrå, blåklint, dån, lomme, snärjmåra, vallmo)	4	—

5. Ogrässets utveckling vid bekämpning

Små plantor, lägre än 4 cm (tidig bekämpning)	1	—
Medelstora plantor	3	—
Stora plantor, högre än 8 cm (sen bekämpning)	5	—

6. Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning

Bättre än normalt (över 14 °C, god markfukt)	1	—
Normala	3	—
Sämre än normalt (under 10 °C, torra)	5	—

7. Väderlek under bekämpningsdagen

Fuktigt, varmt	1	—
Torr, varmt	2	—
Fuktigt, kallt	3	—
Torr, kallt	4	—

Totalt antal poäng _____

DOSREKOMMENDATION

Antal poäng	Procent av normal dos
28 eller mer	100
23 – 27	75
18 – 22	50
17 eller mindre	25

Anteckningar

Dominerande ogräsarter:

Preparat och dos:

Datum för bekämpning:

Sprutförare:

Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):

.....

Höstsäd

Skifte.....

För anpassad bekämpning av **örtogräs** på våren

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid spruttillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

	Poäng	Antal poäng
1. Gröda		
Höstråg	1	—
Rågvede/höstkorn	3	—
Höstvede:		
långstråig sort, t.ex. Kosack, Olivin	5	—
kortstråig sort, t.ex. Audi, Boomer, Elvis, Harnesk, Kranich, Loyal	8	—
2. Grödans konkurrensförmåga		
Bättre än normal (grödan är jämn och tät)	1	—
Normal	3	—
Sämlre än normal (grödan är ojämn och luckig)	6	—
3. Ogräsmängd		
Liten (0–1 planta under en handflata)	1	—
Måttlig	3	—
Stor (minst 3 plantor under en handflata)	5	—
4. Ogräsarternas konkurrensförmåga		
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, plister, veronika, viol)	1	—
Måttlig (både lågvuxna och högvuxna arter)	2	—
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrå, blåklint, dån, lomme, snärjmåra, vallmo)	4	—

5. Ogrässets utveckling vid bekämpning

Små plantor, lägre än 4 cm (tidig bekämpning)	1	—
Medelstora plantor	3	—
Stora plantor, högre än 8 cm (sen bekämpning)	5	—

6. Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning

Bättre än normalt (över 14 °C, god markfukt)	1	—
Normala	3	—
Sämre än normalt (under 10 °C, torra)	5	—

7. Väderlek under bekämpningsdagen

Fuktigt, varmt	1	—
Torr, varmt	2	—
Fuktigt, kallt	3	—
Torr, kallt	4	—

Totalt antal poäng _____

DOSREKOMMENDATION

Antal poäng	Procent av normal dos
28 eller mer	100
23 – 27	75
18 – 22	50
17 eller mindre	25

Anteckningar

Dominerande ogräsarter:

Preparat och dos:

Datum för bekämpning:

Sprutförare:

Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):
.....

Höstsäd

Skifte.....

För anpassad bekämpning av **örtogräs** på våren

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid spruttillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

	Poäng	Antal poäng
1. Gröda		
Höstråg	1	—
Rågvede/höstkorn	3	—
Höstvede:		
långstråig sort, t.ex. Kosack, Olivin	5	—
kortstråig sort, t.ex. Audi, Boomer, Elvis, Harnesk, Kranich, Loyal	8	—
2. Grödans konkurrensförmåga		
Bättre än normal (grödan är jämn och tät)	1	—
Normal	3	—
Sämlre än normal (grödan är ojämn och luckig)	6	—
3. Ogräsmängd		
Liten (0–1 planta under en handflata)	1	—
Måttlig	3	—
Stor (minst 3 plantor under en handflata)	5	—
4. Ogräsarternas konkurrensförmåga		
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, plister, veronika, viol)	1	—
Måttlig (både lågvuxna och högvuxna arter)	2	—
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrå, blåklint, dån, lomme, snärjmåra, vallmo)	4	—

5. Ogrässets utveckling vid bekämpning

Små plantor, lägre än 4 cm (tidig bekämpning)	1	—
Medelstora plantor	3	—
Stora plantor, högre än 8 cm (sen bekämpning)	5	—

6. Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning

Bättre än normalt (över 14 °C, god markfukt)	1	—
Normala	3	—
Sämre än normalt (under 10 °C, torra)	5	—

7. Väderlek under bekämpningsdagen

Fuktigt, varmt	1	—
Torr, varmt	2	—
Fuktigt, kallt	3	—
Torr, kallt	4	—

Totalt antal poäng _____

DOSREKOMMENDATION

Antal poäng	Procent av normal dos
28 eller mer	100
23 – 27	75
18 – 22	50
17 eller mindre	25

Anteckningar

Dominerande ogräsarter:

Preparat och dos:

Datum för bekämpning:

Sprutförare:

Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):
.....

Höstsäd

Skifte.....

För anpassad bekämpning av **örtogräs** på våren

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid spruttillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

	Poäng	Antal poäng
1. Gröda		
Höstråg	1	—
Rågvede/höstkorn	3	—
Höstvede:		
långstråig sort, t.ex. Kosack, Olivin	5	—
kortstråig sort, t.ex. Audi, Boomer, Elvis, Harnesk, Kranich, Loyal	8	—
2. Grödans konkurrensförmåga		
Bättre än normal (grödan är jämn och tät)	1	—
Normal	3	—
Sämré än normal (grödan är ojämn och luckig)	6	—
3. Ogräsmängd		
Liten (0–1 planta under en handflata)	1	—
Måttlig	3	—
Stor (minst 3 plantor under en handflata)	5	—
4. Ogräsarternas konkurrensförmåga		
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, plister, veronika, viol)	1	—
Måttlig (både lågvuxna och högvuxna arter)	2	—
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrå, blåklint, dân, lomme, snärjmåra, vallmo)	4	—

5. Ogrässets utveckling vid bekämpning

Små plantor, lägre än 4 cm (tidig bekämpning)	1	—
Medelstora plantor	3	—
Stora plantor, högre än 8 cm (sen bekämpning)	5	—

6. Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning

Bättre än normalt (över 14 °C, god markfukt)	1	—
Normala	3	—
Sämre än normalt (under 10 °C, torra)	5	—

7. Väderlek under bekämpningsdagen

Fuktigt, varmt	1	—
Torr, varmt	2	—
Fuktigt, kallt	3	—
Torr, kallt	4	—

Totalt antal poäng _____

DOSREKOMMENDATION

Antal poäng	Procent av normal dos
28 eller mer	100
23 – 27	75
18 – 22	50
17 eller mindre	25

Anteckningar

Dominerande ogräsarter:

Preparat och dos:

Datum för bekämpning:

Sprutförare:

Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):
.....

Höstsäd

Skifte.....

För anpassad bekämpning av **örtogräs** på våren

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid spruttillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

	Poäng	Antal poäng
1. Gröda		
Höstråg	1	—
Rågvete/höstkorn	3	—
Höstvete:		
långstråig sort, t.ex. Kosack, Olivin	5	—
kortstråig sort, t.ex. Audi, Boomer, Elvis, Harnesk, Kranich, Loyal	8	—
2. Grödans konkurrensförmåga		
Bättre än normal (grödan är jämn och tät)	1	—
Normal	3	—
Sämlre än normal (grödan är ojämn och luckig)	6	—
3. Ogräsmängd		
Liten (0–1 planta under en handflata)	1	—
Måttlig	3	—
Stor (minst 3 plantor under en handflata)	5	—
4. Ogräsarternas konkurrensförmåga		
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, plister, veronika, viol)	1	—
Måttlig (både lågvuxna och högvuxna arter)	2	—
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrå, blåklint, dån, lomme, snärjmåra, vallmo)	4	—

5. Ogrässets utveckling vid bekämpning

Små plantor, lägre än 4 cm (tidig bekämpning)	1	—
Medelstora plantor	3	—
Stora plantor, högre än 8 cm (sen bekämpning)	5	—

6. Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning

Bättre än normalt (över 14 °C, god markfukt)	1	—
Normala	3	—
Sämre än normalt (under 10 °C, torra)	5	—

7. Väderlek under bekämpningsdagen

Fuktigt, varmt	1	—
Torr, varmt	2	—
Fuktigt, kallt	3	—
Torr, kallt	4	—

Totalt antal poäng _____

DOSREKOMMENDATION

Antal poäng	Procent av normal dos
28 eller mer	100
23 – 27	75
18 – 22	50
17 eller mindre	25

Anteckningar

Dominerande ogräsarter:

Preparat och dos:

Datum för bekämpning:

Sprutförare:

Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):
.....

Höstsäd

Skifte.....

För anpassad bekämpning av **örtogräs** på våren

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid spruttillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

	Poäng	Antal poäng
1. Gröda		
Höstråg	1	—
Rågvede/höstkorn	3	—
Höstvede:		
långstråig sort, t.ex. Kosack, Olivin	5	—
kortstråig sort, t.ex. Audi, Boomer, Elvis, Harnesk, Kranich, Loyal	8	—
2. Grödans konkurrensförmåga		
Bättre än normal (grödan är jämn och tät)	1	—
Normal	3	—
Sämrre än normal (grödan är ojämn och luckig)	6	—
3. Ogräsmängd		
Liten (0–1 planta under en handflata)	1	—
Måttlig	3	—
Stor (minst 3 plantor under en handflata)	5	—
4. Ogräsarternas konkurrensförmåga		
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, plister, veronika, viol)	1	—
Måttlig (både lågvuxna och högvuxna arter)	2	—
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrå, blåklint, dån, lomme, snärjmåra, vallmo)	4	—

5. Ogrässets utveckling vid bekämpning

Små plantor, lägre än 4 cm (tidig bekämpning)	1	—
Medelstora plantor	3	—
Stora plantor, högre än 8 cm (sen bekämpning)	5	—

6. Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning

Bättre än normalt (över 14 °C, god markfukt)	1	—
Normala	3	—
Sämre än normalt (under 10 °C, torra)	5	—

7. Väderlek under bekämpningsdagen

Fuktigt, varmt	1	—
Torr, varmt	2	—
Fuktigt, kallt	3	—
Torr, kallt	4	—

Totalt antal poäng _____

DOSREKOMMENDATION

Antal poäng	Procent av normal dos
28 eller mer	100
23 – 27	75
18 – 22	50
17 eller mindre	25

Anteckningar

Dominerande ogräsarter:

Preparat och dos:

Datum för bekämpning:

Sprutförare:

Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):

.....

Höstsäd

Skifte.....

För anpassad bekämpning av **örtogräs** på våren

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid spruttillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

	Poäng	Antal poäng
1. Gröda		
Höstråg	1	—
Rågvede/höstkorn	3	—
Höstvede:		
långstråig sort, t.ex. Kosack, Olivin	5	—
kortstråig sort, t.ex. Audi, Boomer, Elvis, Harnesk, Kranich, Loyal	8	—
2. Grödans konkurrensförmåga		
Bättre än normal (grödan är jämn och tät)	1	—
Normal	3	—
Sämré än normal (grödan är ojämn och luckig)	6	—
3. Ogräsmängd		
Liten (0–1 planta under en handflata)	1	—
Måttlig	3	—
Stor (minst 3 plantor under en handflata)	5	—
4. Ogräsarternas konkurrensförmåga		
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, plister, veronika, viol)	1	—
Måttlig (både lågvuxna och högvuxna arter)	2	—
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrå, blåklint, dån, lomme, snärjmåra, vallmo)	4	—

5. Ogrässets utveckling vid bekämpning

Små plantor, lägre än 4 cm (tidig bekämpning)	1	—
Medelstora plantor	3	—
Stora plantor, högre än 8 cm (sen bekämpning)	5	—

6. Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning

Bättre än normalt (över 14 °C, god markfukt)	1	—
Normala	3	—
Sämre än normalt (under 10 °C, torra)	5	—

7. Väderlek under bekämpningsdagen

Fuktigt, varmt	1	—
Torr, varmt	2	—
Fuktigt, kallt	3	—
Torr, kallt	4	—

Totalt antal poäng _____

DOSREKOMMENDATION

Antal poäng	Procent av normal dos
28 eller mer	100
23 – 27	75
18 – 22	50
17 eller mindre	25

Anteckningar

Dominerande ogräsarter:

Preparat och dos:

Datum för bekämpning:

Sprutförare:

Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):
.....

Höstsäd

Skifte.....

För anpassad bekämpning av **örtogräs** på våren

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid spruttillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

	Poäng	Antal poäng
1. Gröda		
Höstråg	1	—
Rågvede/höstkorn	3	—
Höstvede:		
långstråig sort, t.ex. Kosack, Olivin	5	—
kortstråig sort, t.ex. Audi, Boomer, Elvis, Harnesk, Kranich, Loyal	8	—
2. Grödans konkurrensförmåga		
Bättre än normal (grödan är jämn och tät)	1	—
Normal	3	—
Sämrre än normal (grödan är ojämn och luckig)	6	—
3. Ogräsmängd		
Liten (0–1 planta under en handflata)	1	—
Måttlig	3	—
Stor (minst 3 plantor under en handflata)	5	—
4. Ogräsarternas konkurrensförmåga		
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, plister, veronika, viol)	1	—
Måttlig (både lågvuxna och högvuxna arter)	2	—
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrå, blåklint, dån, lomme, snärjmåra, vallmo)	4	—

5. Ogrässets utveckling vid bekämpning

Små plantor, lägre än 4 cm (tidig bekämpning)	1	—
Medelstora plantor	3	—
Stora plantor, högre än 8 cm (sen bekämpning)	5	—

6. Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning

Bättre än normalt (över 14 °C, god markfukt)	1	—
Normala	3	—
Sämre än normalt (under 10 °C, torra)	5	—

7. Väderlek under bekämpningsdagen

Fuktigt, varmt	1	—
Torr, varmt	2	—
Fuktigt, kallt	3	—
Torr, kallt	4	—

Totalt antal poäng _____

DOSREKOMMENDATION

Antal poäng	Procent av normal dos
28 eller mer	100
23 – 27	75
18 – 22	50
17 eller mindre	25

Anteckningar

Dominerande ogräsarter:

Preparat och dos:

Datum för bekämpning:

Sprutförare:

Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):
.....

Höstsäd

Skifte.....

För anpassad bekämpning av **örtogräs** på våren

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid spruttillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

	Poäng	Antal poäng
1. Gröda		
Höstråg	1	—
Rågvede/höstkorn	3	—
Höstvede:		
långstråig sort, t.ex. Kosack, Olivin	5	—
kortstråig sort, t.ex. Audi, Boomer, Elvis, Harnesk, Kranich, Loyal	8	—
2. Grödans konkurrensförmåga		
Bättre än normal (grödan är jämn och tät)	1	—
Normal	3	—
Sämré än normal (grödan är ojämn och luckig)	6	—
3. Ogräsmängd		
Liten (0–1 planta under en handflata)	1	—
Måttlig	3	—
Stor (minst 3 plantor under en handflata)	5	—
4. Ogräsarternas konkurrensförmåga		
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, plister, veronika, viol)	1	—
Måttlig (både lågvuxna och högvuxna arter)	2	—
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrå, blåklint, dån, lomme, snärjmåra, vallmo)	4	—

5. Ogrässets utveckling vid bekämpning

Små plantor, lägre än 4 cm (tidig bekämpning)	1	—
Medelstora plantor	3	—
Stora plantor, högre än 8 cm (sen bekämpning)	5	—

6. Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning

Bättre än normalt (över 14 °C, god markfukt)	1	—
Normala	3	—
Sämre än normalt (under 10 °C, torra)	5	—

7. Väderlek under bekämpningsdagen

Fuktigt, varmt	1	—
Torr, varmt	2	—
Fuktigt, kallt	3	—
Torr, kallt	4	—

Totalt antal poäng _____

DOSREKOMMENDATION

Antal poäng	Procent av normal dos
28 eller mer	100
23 – 27	75
18 – 22	50
17 eller mindre	25

Anteckningar

Dominerande ogräsarter:

Preparat och dos:

Datum för bekämpning:

Sprutförare:

Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):
.....

Höstsäd

Skifte.....

För anpassad bekämpning av **örtogräs** på våren

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid spruttillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

	Poäng	Antal poäng
1. Gröda		
Höstråg	1	—
Rågvede/höstkorn	3	—
Höstvede:		
långstråig sort, t.ex. Kosack, Olivin	5	—
kortstråig sort, t.ex. Audi, Boomer, Elvis, Harnesk, Kranich, Loyal	8	—
2. Grödans konkurrensförmåga		
Bättre än normal (grödan är jämn och tät)	1	—
Normal	3	—
Sämrre än normal (grödan är ojämn och luckig)	6	—
3. Ogräsmängd		
Liten (0–1 planta under en handflata)	1	—
Måttlig	3	—
Stor (minst 3 plantor under en handflata)	5	—
4. Ogräsarternas konkurrensförmåga		
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, plister, veronika, viol)	1	—
Måttlig (både lågvuxna och högvuxna arter)	2	—
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrå, blåklint, dån, lomme, snärjmåra, vallmo)	4	—

5. Ogrässets utveckling vid bekämpning

Små plantor, lägre än 4 cm (tidig bekämpning)	1	—
Medelstora plantor	3	—
Stora plantor, högre än 8 cm (sen bekämpning)	5	—

6. Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning

Bättre än normalt (över 14 °C, god markfukt)	1	—
Normala	3	—
Sämre än normalt (under 10 °C, torra)	5	—

7. Väderlek under bekämpningsdagen

Fuktigt, varmt	1	—
Torr, varmt	2	—
Fuktigt, kallt	3	—
Torr, kallt	4	—

Totalt antal poäng _____

DOSREKOMMENDATION

Antal poäng	Procent av normal dos
28 eller mer	100
23 – 27	75
18 – 22	50
17 eller mindre	25

Anteckningar

Dominerande ogräsarter:

Preparat och dos:

Datum för bekämpning:

Sprutförare:

Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):
.....

Höstsäd

Skifte.....

För anpassad bekämpning av **örtogräs** på våren

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid spruttillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

	Poäng	Antal poäng
1. Gröda		
Höstråg	1	—
Rågvede/höstkorn	3	—
Höstvede:		
långstråig sort, t.ex. Kosack, Olivin	5	—
kortstråig sort, t.ex. Audi, Boomer, Elvis, Harnesk, Kranich, Loyal	8	—
2. Grödans konkurrensförmåga		
Bättre än normal (grödan är jämn och tät)	1	—
Normal	3	—
Sämrre än normal (grödan är ojämn och luckig)	6	—
3. Ogräsmängd		
Liten (0–1 planta under en handflata)	1	—
Måttlig	3	—
Stor (minst 3 plantor under en handflata)	5	—
4. Ogräsarternas konkurrensförmåga		
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, plister, veronika, viol)	1	—
Måttlig (både lågvuxna och högvuxna arter)	2	—
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrå, blåklint, dån, lomme, snärjmåra, vallmo)	4	—

5. Ogrässets utveckling vid bekämpning

Små plantor, lägre än 4 cm (tidig bekämpning)	1	—
Medelstora plantor	3	—
Stora plantor, högre än 8 cm (sen bekämpning)	5	—

6. Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning

Bättre än normalt (över 14 °C, god markfukt)	1	—
Normala	3	—
Sämre än normalt (under 10 °C, torra)	5	—

7. Väderlek under bekämpningsdagen

Fuktigt, varmt	1	—
Torr, varmt	2	—
Fuktigt, kallt	3	—
Torr, kallt	4	—

Totalt antal poäng _____

DOSREKOMMENDATION

Antal poäng	Procent av normal dos
28 eller mer	100
23 – 27	75
18 – 22	50
17 eller mindre	25

Anteckningar

Dominerande ogräsarter:

Preparat och dos:

Datum för bekämpning:

Sprutförare:

Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):
.....

.....
 Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):

 Sprutförare:
 Datum för bekämpning:
 Preparat och dos:
 Dominerande ogräsarter:

Anteckningar

Antal poäng	Procent av normal dos
29 eller mer	100
24 – 28	75
19 – 23	50
18 eller mindre	25

DOSEKOMMENDATION

- Totalt antal poäng** _____
8. **Vädreläk under bekämpningsdagen**

1	—	Fuktigt, varmt
2	—	Torr, varmt
3	—	Fuktigt, kallt
4	—	Torr, kallt

 7. **Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning**

1	—	Bättre än normalt (varmt, god markfukt)
3	—	Normala
5	—	Sämré än normalt (svalt, torra)

 6. **Ogrässets utveckling vid bekämpning**

1	—	Små plantor, 1–3 örtblad (tidig bekämpning)
2	—	Medelstora plantor
4	—	Stora plantor, 4–6 örtblad (sen bekämpning)

Värsäd

För anpassad bekämpning av örtogräs

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid sprutstillfallet.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

Poäng Antal
poäng

1. **Gröda**
6-radskorn 1 —
Havre/korn 2 —
Vårmete 3 —

2. **Grödans konkurrensförmåga**
Bättre uppkomst och utveckling än normal 1 —
Normal 3 —
Sämare uppkomst och utveckling än normal 5 —

3. **Jordart**
Styv lera/mellanlera 1 —
Lättlera 2 —
Lättare mineraljord (mo/mjåla) 3 —
Muljord 5 —

4. **Ogräsmängd**
Liten (0-1 planta under en handflata) 1 —
Mätlig 3 —
Stor (minst 4 plantor under en handflata) 5 —

5. **Ogräsarternas konkurrensförmåga**
Liten (mest lågvuxna arter: förgättingej, jordök, plister, trampört, viol, våtarv) 1 —
Mätlig (både lågvuxna och högvuxna arter) 2 —
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrä, dån, harkäl, mälla, pilört, snärjmåra, åkerbinda) 4 —

.....
 Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):

 Sprutförare:
 Datum för bekämpning:
 Preparat och dos:
 Dominerande ogräsarter:

Anteckningar

Antal poäng	Procent av normal dos
29 eller mer	100
24 – 28	75
19 – 23	50
18 eller mindre	25

DOSEKOMMENDATION

- Totalt antal poäng** _____
8. **Vädreläk under bekämpningsdagen**

1	—	Fuktigt, varmt
2	—	Torr, varmt
3	—	Fuktigt, kallt
4	—	Torr, kallt

 7. **Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning**

1	—	Bättre än normalt (varmt, god markfukt)
3	—	Normala
5	—	Sämré än normalt (svalt, torra)

 6. **Ogrässets utveckling vid bekämpning**

1	—	Små plantor, 1–3 örtblad (tidig bekämpning)
2	—	Medelstora plantor
4	—	Stora plantor, 4–6 örtblad (sen bekämpning)

Värsäd

För anpassad bekämpning av örtogräs

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid sprutstillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

Poäng Antal
poäng

1. Gröda
6-radskorn 1
Havre/korn 2
Vårvete 3

2. Grödans konkurrensförmåga
Bättre uppkomst och utveckling än normal 1
Normal 3
Sämare uppkomst och utveckling än normal 5

3. Jordart
Styv lera/mellanlera 1
Lättlera 2
Lättare mineraljord (mo/mjåla) 3
Muljord 5

4. Ögräsängd
Liten (0-1 planta under en handflata) 1
Mätlig 3
Stor (minst 4 plantor under en handflata) 5

5. Ögräsarternas konkurrensförmåga
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, jordrök, plister, trampört, viol, våtarv) 1
Mätlig (både lågvuxna och högvuxna arter) 2
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrä, dån, harkål, mälla, pilört, snärjmåra, åkerbinda) 4

.....
 Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):
 Sprutförare:
 Datum för bekämpning:
 Preparat och dos:
 Dominerande ogräsarter:

Anteckningar

Antal poäng	Procent av normal dos
29 eller mer	100
24 – 28	75
19 – 23	50
18 eller mindre	25

DOSEKOMMENDATION

- Totalt antal poäng** _____
8. **Vädreläk under bekämpningsdagen**

1	—	Fuktigt, varmt
2	—	Torr, varmt
3	—	Fuktigt, kallt
4	—	Torr, kallt

 7. **Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning**

1	—	Bättre än normalt (varmt, god markfukt)
3	—	Normala
5	—	Sämré än normalt (svalt, torra)

 6. **Ogrässets utveckling vid bekämpning**

1	—	Små plantor, 1–3 örtblad (tidig bekämpning)
2	—	Medelstora plantor
4	—	Stora plantor, 4–6 örtblad (sen bekämpning)

Värsäd

För anpassad bekämpning av örtogräs

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid sprutstillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

Poäng Antal
poäng

1. Gröda
6-radskorn 1
Havre/korn 2
Vårmete 3

2. Grödans konkurrensförmåga
Bättre uppkomst och utveckling än normal 1
Normal 3
Sämare uppkomst och utveckling än normal 5

3. Jordart
Styv lera/mellanlera 1
Lättlera 2
Lättare mineraljord (mo/mjåla) 3
Muljord 5

4. Ögräsängd
Liten (0-1 planta under en handflata) 1
Mätlig 3
Stor (minst 4 plantor under en handflata) 5

5. Ögräsarternas konkurrensförmåga
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, jordrök, plister, trampört, viol, våtarv) 1
Mätlig (både lågvuxna och högvuxna arter) 2
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrä, dån, harkål, mälla, pilört, snärjmåra, åkerbinda) 4

.....
 Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):
 Sprutförare:
 Datum för bekämpning:
 Preparat och dos:
 Dominerande ogräsarter:

Anteckningar

Antal poäng	Procent av normal dos
29 eller mer	100
24 – 28	75
19 – 23	50
18 eller mindre	25

DOSEKOMMENDATION

- Totalt antal poäng** _____
8. **Vädreläk under bekämpningsdagen**

1	—	Fuktigt, varmt
2	—	Torr, varmt
3	—	Fuktigt, kallt
4	—	Torr, kallt

 7. **Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning**

1	—	Bättre än normalt (varmt, god markfukt)
3	—	Normala
5	—	Sämré än normalt (svalt, torra)

 6. **Ogrässets utveckling vid bekämpning**

1	—	Små plantor, 1–3 örtblad (tidig bekämpning)
2	—	Medelstora plantor
4	—	Stora plantor, 4–6 örtblad (sen bekämpning)

Värsäd

För anpassad bekämpning av örtogräs

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid sprutstillfallet.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

Poäng Antal
poäng

1. Gröda
6-radskorn 1
Havre/korn 2
Vårvete 3

2. Grödans konkurrensförmåga
Bättre uppkomst och utveckling än normal 1
Normal 3
Sämare uppkomst och utveckling än normal 5

3. Jordart
Styv lera/mellanlera 1
Lättlera 2
Lättare mineraljord (mo/mjåla) 3
Muljord 5

4. Ögräsängd
Liten (0-1 planta under en handflata) 1
Mätlig 3
Stor (minst 4 plantor under en handflata) 5

5. Ögräsarternas konkurrensförmåga
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, jordök, plister, trampört, viol, våtarv) 1
Mätlig (både lågvuxna och högvuxna arter) 2
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrä, dån, harkål, mälla, pilört, snärjmåra, åkerbinda) 4

.....
 Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):
 Sprutförare:
 Datum för bekämpning:
 Preparat och dos:
 Dominerande ogräsarter:

Anteckningar

Antal poäng	Procent av normal dos
29 eller mer	100
24 – 28	75
19 – 23	50
18 eller mindre	25

DOSEKOMMENDATION

- Totalt antal poäng** _____
8. **Vädreläk under bekämpningsdagen**

1	—	Fuktigt, varmt
2	—	Torr, varmt
3	—	Fuktigt, kallt
4	—	Torr, kallt

 7. **Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning**

1	—	Bättre än normalt (varmt, god markfukt)
3	—	Normala
5	—	Sämré än normalt (svalt, torra)

 6. **Ogrässets utveckling vid bekämpning**

1	—	Små plantor, 1–3 örtblad (tidig bekämpning)
2	—	Medelstora plantor
4	—	Stora plantor, 4–6 örtblad (sen bekämpning)

Värsäd

För anpassad bekämpning av örtogräs

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid sprutstillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

Poäng Antal
poäng

1. Gröda
6-radskorn 1
Havre/korn 2
Vårvete 3

2. Grödans konkurrensförmåga
Bättre uppkomst och utveckling än normal 1
Normal 3
Sämare uppkomst och utveckling än normal 5

3. Jordart
Styv lera/mellanlera 1
Lättlera 2
Lättare mineraljord (mo/mjåla) 3
Muljord 5

4. Ögräsängd
Liten (0-1 planta under en handflata) 1
Mätlig 3
Stor (minst 4 plantor under en handflata) 5

5. Ögräsarternas konkurrensförmåga
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, jordrök, plister, trampört, viol, våtarv) 1
Mätlig (både lågvuxna och högvuxna arter) 2
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrå, dån, harkål, mälla, pilört, snärjmåra, åkerbinda) 4

.....
 Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):
 Sprutförare:
 Datum för bekämpning:
 Preparat och dos:
 Dominerande ogräsarter:

Anteckningar

Antal poäng	Procent av normal dos
29 eller mer	100
24 – 28	75
19 – 23	50
18 eller mindre	25

DOSEKOMMENDATION

- Totalt antal poäng** _____
8. **Vädrelek under bekämpningsdagen**

1	—	Fuktigt, varmt
2	—	Torr, varmt
3	—	Fuktigt, kallt
4	—	Torr, kallt

 7. **Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning**

1	—	Bättre än normalt (varmt, god markfukt)
3	—	Normala
5	—	Sämré än normalt (svalt, torra)

 6. **Ogrässets utveckling vid bekämpning**

1	—	Små plantor, 1–3 örtblad (tidig bekämpning)
2	—	Medelstora plantor
4	—	Stora plantor, 4–6 örtblad (sen bekämpning)

Värsäd

För anpassad bekämpning av örtogräs

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid sprutstillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

Poäng Antal poäng

- 1. Gröda
6-radskorn
Havre/korn
Vårvete
1 —
2 —
3 —

- 2. Grödans konkurrensförmåga
Bättre uppkomst och utveckling än normal
Normal
Sämare uppkomst och utveckling än normal
1 —
3 —
5 —

- 3. Jordart
Styv lera/mellanlera
Lättlera
Lättare mineraljord (mo/mjåla)
Muljord
1 —
2 —
3 —
5 —

- 4. Ögräsängd
Liten (0-1 planta under en handflata)
Mätlig
Stor (minst 4 plantor under en handflata)
1 —
3 —
5 —

- 5. Ögräsarternas konkurrensförmåga
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, jordök, plister, trampört, viol, våtarv)
Mätlig (både lågvuxna och högvuxna arter)
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrä, dån, harkål, mälla, pilört, snärjmåra, åkerbinda)
1 —
2 —
4 —

Skifte.....

.....

Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):

.....

Spurförare:

.....

Datum för bekämpning:

.....

Preparat och dos:

.....

Dominerande ogräsarter:

Anteckningar

Antal poäng	Procent av normal dos
29 eller mer	100
24 – 28	75
19 – 23	50
18 eller mindre	25

DOSEKOMMENDATION

- Totalt antal poäng** _____
8. **Vädreläk under bekämpningsdagen**
- | | | |
|---|---|----------------|
| 1 | — | Fuktigt, varmt |
| 2 | — | Torr, varmt |
| 3 | — | Fuktigt, kallt |
| 4 | — | Torr, kallt |
7. **Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning**
- | | | |
|---|---|---|
| 1 | — | Bättre än normalt (varmt, god markfukt) |
| 3 | — | Normala |
| 5 | — | Sämré än normalt (svalt, torra) |
6. **Ogrässets utveckling vid bekämpning**
- | | | |
|---|---|---|
| 1 | — | Små plantor, 1–3 örtblad (tidig bekämpning) |
| 2 | — | Medelstora plantor |
| 4 | — | Stora plantor, 4–6 örtblad (sen bekämpning) |

Värsäd

För anpassad bekämpning av örtogräs

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid sprutstillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

Poäng Antal
poäng

1. Gröda
6-radskorn 1
Havre/korn 2
Vårvete 3

2. Grödans konkurrensförmåga
Bättre uppkomst och utveckling än normal 1
Normal 3
Sämare uppkomst och utveckling än normal 5

3. Jordart
Styv lera/mellanlera 1
Lättlera 2
Lättare mineraljord (mo/mjåla) 3
Muljord 5

4. Ögräsängd
Liten (0-1 planta under en handflata) 1
Mätlig 3
Stor (minst 4 plantor under en handflata) 5

5. Ögräsarternas konkurrensförmåga
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, jordrök, plister, trampört, viol, våtarv) 1
Mätlig (både lågvuxna och högvuxna arter) 2
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrå, dån, harkål, mälla, pilört, snärjmåra, åkerbinda) 4

.....

Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):

.....

Spurförare:

.....

Datum för bekämpning:

.....

Preparat och dos:

.....

Dominerande ogräsarter:

Anteckningar

Antal poäng	Procent av normal dos
29 eller mer	100
24 – 28	75
19 – 23	50
18 eller mindre	25

DOSEKOMMENDATION

- Totalt antal poäng** _____
8. **Vädreläk under bekämpningsdagen**
- | | | |
|---|---|----------------|
| 1 | — | Fuktigt, varmt |
| 2 | — | Torr, varmt |
| 3 | — | Fuktigt, kallt |
| 4 | — | Torr, kallt |
7. **Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning**
- | | | |
|---|---|---|
| 1 | — | Bättre än normalt (varmt, god markfukt) |
| 3 | — | Normala |
| 5 | — | Sämré än normalt (svalt, torra) |
6. **Ogrässets utveckling vid bekämpning**
- | | | |
|---|---|---|
| 1 | — | Små plantor, 1–3 örtblad (tidig bekämpning) |
| 2 | — | Medelstora plantor |
| 4 | — | Stora plantor, 4–6 örtblad (sen bekämpning) |

Värsäd

För anpassad bekämpning av örtogräs

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid sprutstillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

Poäng Antal
poäng

1. **Gröda**
6-radskorn — 1
Havre/korn — 2
Vårvete — 3

2. **Grödans konkurrensförmåga**
Bättre uppkomst och utveckling än normal — 1
Normal — 3
Sämare uppkomst och utveckling än normal — 5

3. **Jordart**
Styv lera/mellanlera — 1
Lättlera — 2
Lättare mineraljord (mo/mjåla) — 3
Muljord — 5

4. **Ogräsmängd**
Liten (0-1 planta under en handflata) — 1
Mätlig — 3
Stor (minst 4 plantor under en handflata) — 5

5. **Ogräsarternas konkurrensförmåga**
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, jordrök, plister, trampört, viol, våtarv) — 1
Mätlig (både lågvuxna och högvuxna arter) — 2
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrä, dån, harkål, mälla, pilört, snärjmåra, åkerbinda) — 4

.....
 Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):

 Sprutförare:
 Datum för bekämpning:
 Preparat och dos:
 Dominerande ogräsarter:

Anteckningar

Antal poäng	Procent av normal dos
29 eller mer	100
24 – 28	75
19 – 23	50
18 eller mindre	25

DOSEKOMMENDATION

- Totalt antal poäng** _____
8. **Vädreläk under bekämpningsdagen**

1	—	Fuktigt, varmt
2	—	Torr, varmt
3	—	Fuktigt, kallt
4	—	Torr, kallt

 7. **Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning**

1	—	Bättre än normalt (varmt, god markfukt)
3	—	Normala
5	—	Sämré än normalt (svalt, torra)

 6. **Ogrässets utveckling vid bekämpning**

1	—	Små plantor, 1–3 örtblad (tidig bekämpning)
2	—	Medelstora plantor
4	—	Stora plantor, 4–6 örtblad (sen bekämpning)

Värsäd

För anpassad bekämpning av örtogräs

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid sprutstillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

Poäng Antal
poäng

1. **Gröda**
6-radskorn 1
Havre/korn 2
Vårvete 3

2. **Grödans konkurrensförmåga**
Bättre uppkomst och utveckling än normal 1
Normal 3
Sämare uppkomst och utveckling än normal 5

3. **Jordart**
Styv lera/mellanlera 1
Lättlera 2
Lättare mineraljord (mo/mjåla) 3
Muljord 5

4. **Ogräsmängd**
Liten (0-1 planta under en handflata) 1
Mätlig 3
Stor (minst 4 plantor under en handflata) 5

5. **Ogräsarternas konkurrensförmåga**
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, jordrok, plister, trampört, viol, våtarv) 1
Mätlig (både lågvuxna och högvuxna arter) 2
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrå, dån, harkål, mälla, pilört, snärjmåra, åkerbinda) 4

.....
 Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):

 Sprutförare:
 Datum för bekämpning:
 Preparat och dos:
 Dominerande ogräsarter:

Anteckningar

Antal poäng	Procent av normal dos
29 eller mer	100
24 – 28	75
19 – 23	50
18 eller mindre	25

DOSREKOMMENDATION

- Totalt antal poäng** _____
8. **Vädreläk under bekämpningsdagen**

1	—	Fuktigt, varmt
2	—	Torr, varmt
3	—	Fuktigt, kallt
4	—	Torr, kallt

 7. **Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning**

1	—	Bättre än normalt (varmt, god markfukt)
3	—	Normala
5	—	Sämrre än normalt (svalt, torra)

 6. **Ogrässets utveckling vid bekämpning**

1	—	Små plantor, 1–3 örtblad (tidig bekämpning)
2	—	Medelstora plantor
4	—	Stora plantor, 4–6 örtblad (sen bekämpning)

Värsäd

För anpassad bekämpning av örtogräs

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid sprutstillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

Poäng Antal
poäng

1. Gröda
6-radskorn 1
Havre/korn 2
Vårvete 3

2. Grödans konkurrensförmåga
Bättre uppkomst och utveckling än normal 1
Normal 3
Sämare uppkomst och utveckling än normal 5

3. Jordart
Styv lera/mellanlera 1
Lättlera 2
Lättare mineraljord (mo/mjåla) 3
Muljord 5

4. Ögräsängd
Liten (0-1 planta under en handflata) 1
Mätlig 3
Stor (minst 4 plantor under en handflata) 5

5. Ögräsarternas konkurrensförmåga
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, jordök, plister, trampört, viol, våtarv) 1
Mätlig (både lågvuxna och högvuxna arter) 2
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrä, dån, harkål, mälla, pilört, snärjmåra, åkerbinda) 4

.....
 Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):
 Sprutförare:
 Datum för bekämpning:
 Preparat och dos:
 Dominerande ogräsarter:

Anteckningar

Antal poäng	Procent av normal dos
29 eller mer	100
24 – 28	75
19 – 23	50
18 eller mindre	25

DOSEKOMMENDATION

- Totalt antal poäng** _____
8. **Vädreläk under bekämpningsdagen**

1	—	Fuktigt, varmt
2	—	Torr, varmt
3	—	Fuktigt, kallt
4	—	Torr, kallt

 7. **Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning**

1	—	Bättre än normalt (varmt, god markfukt)
3	—	Normala
5	—	Sämré än normalt (svalt, torra)

 6. **Ogrässets utveckling vid bekämpning**

1	—	Små plantor, 1–3 örtblad (tidig bekämpning)
2	—	Medelstora plantor
4	—	Stora plantor, 4–6 örtblad (sen bekämpning)

Värsäd

För anpassad bekämpning av örtogräs

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid sprutstillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

Poäng Antal
poäng

1. Gröda
6-radskorn 1
Havre/korn 2
Vårvete 3

2. Grödans konkurrensförmåga
Bättre uppkomst och utveckling än normal 1
Normal 3
Sämare uppkomst och utveckling än normal 5

3. Jordart
Styv lera/mellanlera 1
Lättlera 2
Lättare mineraljord (mo/mjåla) 3
Muljord 5

4. Ögräsängd
Liten (0-1 planta under en handflata) 1
Mätlig 3
Stor (minst 4 plantor under en handflata) 5

5. Ögräsarternas konkurrensförmåga
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, jordrök, plister, trampört, viol, våtarv) 1
Mätlig (både lågvuxna och högvuxna arter) 2
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrä, dån, harkål, mälla, pilört, snärjmåra, åkerbinda) 4

.....

Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):

.....

Sputförare:

.....

Datum för bekämpning:

.....

Preparat och dos:

.....

Dominerande ogräsarter:

Anteckningar

Antal poäng	Procent av normal dos
29 eller mer	100
24 – 28	75
19 – 23	50
18 eller mindre	25

DOSEKOMMENDATION

- Totalt antal poäng** _____
8. **Vädreläk under bekämpningsdagen**

1	—	Fuktigt, varmt
2	—	Torr, varmt
3	—	Fuktigt, kallt
4	—	Torr, kallt

 7. **Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning**

1	—	Bättre än normalt (varmt, god markfukt)
3	—	Normala
5	—	Sämré än normalt (svalt, torra)

 6. **Ogrässets utveckling vid bekämpning**

1	—	Små plantor, 1–3 örtblad (tidig bekämpning)
2	—	Medelstora plantor
4	—	Stora plantor, 4–6 örtblad (sen bekämpning)

Värsäd

För anpassad bekämpning av örtogräs

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid sprutstillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

Poäng Antal
poäng

1. Gröda
6-radskorn 1
Havre/korn 2
Vårvete 3

2. Grödans konkurrensförmåga
Bättre uppkomst och utveckling än normal 1
Normal 3
Sämare uppkomst och utveckling än normal 5

3. Jordart
Styv lera/mellanlera 1
Lättlera 2
Lättare mineraljord (mo/mjåla) 3
Muljord 5

4. Ögräsängd
Liten (0-1 planta under en handflata) 1
Mätlig 3
Stor (minst 4 plantor under en handflata) 5

5. Ögräsarternas konkurrensförmåga
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, jordök, plister, trampört, viol, våtarv) 1
Mätlig (både lågvuxna och högvuxna arter) 2
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrå, dån, harkål, mälla, pilört, snärjmåra, åkerbinda) 4

.....
 Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):
 Sprutförare:
 Datum för bekämpning:
 Preparat och dos:
 Dominerande ogräsarter:

Anteckningar

Antal poäng	Procent av normal dos
29 eller mer	100
24 – 28	75
19 – 23	50
18 eller mindre	25

DOSEKOMMENDATION

- Totalt antal poäng** _____
8. **Vädreläk under bekämpningsdagen**

1	—	Fuktigt, varmt
2	—	Torr, varmt
3	—	Fuktigt, kallt
4	—	Torr, kallt

 7. **Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning**

1	—	Bättre än normalt (varmt, god markfukt)
3	—	Normala
5	—	Sämré än normalt (svalt, torra)

 6. **Ogrässets utveckling vid bekämpning**

1	—	Små plantor, 1–3 örtblad (tidig bekämpning)
2	—	Medelstora plantor
4	—	Stora plantor, 4–6 örtblad (sen bekämpning)

Värsäd

För anpassad bekämpning av örtogräs

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid sprutstillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

Poäng Antal
poäng

1. Gröda
6-radskorn 1
Havre/korn 2
Vårvete 3

2. Grödans konkurrensförmåga
Bättre uppkomst och utveckling än normal 1
Normal 3
Sämare uppkomst och utveckling än normal 5

3. Jordart
Styv lera/mellanlera 1
Lättlera 2
Lättare mineraljord (mo/mjåla) 3
Muljord 5

4. Ögräsängd
Liten (0-1 planta under en handflata) 1
Mätlig 3
Stor (minst 4 plantor under en handflata) 5

5. Ögräsarternas konkurrensförmåga
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, jordrök, plister, trampört, viol, våtarv) 1
Mätlig (både lågvuxna och högvuxna arter) 2
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrä, dån, harkål, mälla, pilört, snärjmåra, åkerbinda) 4

.....
 Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):
 Sprutförare:
 Datum för bekämpning:
 Preparat och dos:
 Dominerande ogräsarter:

Anteckningar

Antal poäng	Procent av normal dos
29 eller mer	100
24 – 28	75
19 – 23	50
18 eller mindre	25

DOSEKOMMENDATION

- Totalt antal poäng** _____
8. **Vädreläk under bekämpningsdagen**

1	—	Fuktigt, varmt
2	—	Torr, varmt
3	—	Fuktigt, kallt
4	—	Torr, kallt

 7. **Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning**

1	—	Bättre än normalt (varmt, god markfukt)
3	—	Normala
5	—	Sämrre än normalt (svalt, torra)

 6. **Ogrässets utveckling vid bekämpning**

1	—	Små plantor, 1–3 örtblad (tidig bekämpning)
2	—	Medelstora plantor
4	—	Stora plantor, 4–6 örtblad (sen bekämpning)

Värsäd

För anpassad bekämpning av örtogräs

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid sprutstillfallet.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

Poäng Antal
poäng

1. **Gröda**
6-radskorn 1 —
Havre/korn 2 —
Vårvete 3 —

2. **Grödans konkurrensförmåga**
Bättre uppkomst och utveckling än normal 1 —
Normal 3 —
Sämare uppkomst och utveckling än normal 5 —

3. **Jordart**
Styv lera/mellanlera 1 —
Lättlera 2 —
Lättare mineraljord (mo/mjåla) 3 —
Muljord 5 —

4. **Ogräsmängd**
Liten (0-1 planta under en handflata) 1 —
Mätlig 3 —
Stor (minst 4 plantor under en handflata) 5 —

5. **Ogräsarternas konkurrensförmåga**
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, jordrok, plister, trampört, viol, våtarv) 1 —
Mätlig (både lågvuxna och högvuxna arter) 2 —
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrä, dån, harkål, mälla, pilört, snärjmåra, åkerbinda) 4 —

.....
 Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):

 Sprutförare:
 Datum för bekämpning:
 Preparat och dos:
 Dominerande ogräsarter:

Anteckningar

Antal poäng	Procent av normal dos
29 eller mer	100
24 – 28	75
19 – 23	50
18 eller mindre	25

DOSREKOMMENDATION

- Totalt antal poäng** _____
8. **Vädreläk under bekämpningsdagen**

1	—	Fuktigt, varmt
2	—	Torr, varmt
3	—	Fuktigt, kallt
4	—	Torr, kallt

 7. **Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning**

1	—	Bättre än normalt (varmt, god markfukt)
3	—	Normala
5	—	Sämré än normalt (svalt, torra)

 6. **Ogrässets utveckling vid bekämpning**

1	—	Små plantor, 1–3 örtblad (tidig bekämpning)
2	—	Medelstora plantor
4	—	Stora plantor, 4–6 örtblad (sen bekämpning)

Värsäd

För anpassad bekämpning av örtogräs

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid sprutstillfallet.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

Poäng Antal
poäng

1. **Gröda**
6-radskorn 1 —
Havre/korn 2 —
Vårvete 3 —

2. **Grödans konkurrensförmåga**
Bättre uppkomst och utveckling än normal 1 —
Normal 3 —
Sämare uppkomst och utveckling än normal 5 —

3. **Jordart**
Styv lera/mellanlera 1 —
Lättlera 2 —
Lättare mineraljord (mo/mjåla) 3 —
Muljord 5 —

4. **Ogräsmängd**
Liten (0-1 planta under en handflata) 1 —
Mätlig 3 —
Stor (minst 4 plantor under en handflata) 5 —

5. **Ogräsarternas konkurrensförmåga**
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, jordrök, plister, trampört, viol, våtarv) 1 —
Mätlig (både lågvuxna och högvuxna arter) 2 —
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrå, dån, harkål, mälla, pilört, snärjmåra, åkerbinda) 4 —

.....
 Erhållen effekt 4 – 6 veckor efter bekämpning (till exempel mycket god, god, måttlig eller svag):
 Sprutförare:
 Datum för bekämpning:
 Preparat och dos:
 Dominerande ogräsarter:

Anteckningar

Antal poäng	Procent av normal dos
29 eller mer	100
24 – 28	75
19 – 23	50
18 eller mindre	25

DOSREKOMMENDATION

- Totalt antal poäng** _____
8. **Vädreläk under bekämpningsdagen**

1	—	Fuktigt, varmt
2	—	Torr, varmt
3	—	Fuktigt, kallt
4	—	Torr, kallt

 7. **Tillväxtbetingelser dagarna före bekämpning**

1	—	Bättre än normalt (varmt, god markfukt)
3	—	Normala
5	—	Sämré än normalt (svält, torra)

 6. **Ogrässets utveckling vid bekämpning**

1	—	Små plantor, 1–3 örtblad (tidig bekämpning)
2	—	Medelstora plantor
4	—	Stora plantor, 4–6 örtblad (sen bekämpning)

Värsäd

För anpassad bekämpning av örtogräs

Nyckeln används på följande sätt:

Välj det poäng vid varje punkt som passar bäst i det aktuella skiftet vid sprutstillfället.

OBS! Det går också bra att välja ett poäng mellan de angivna poängen.

Poäng Antal
poäng

1. **Gröda**
6-radskorn — 1
Havre/korn — 2
Vårvete — 3

2. **Grödans konkurrensförmåga**
Bättre uppkomst och utveckling än normal — 1
Normal — 3
Sämare uppkomst och utveckling än normal — 5

3. **Jordart**
Styv lera/mellanlera — 1
Lättlera — 2
Lättare mineraljord (mo/mjåla) — 3
Muljord — 5

4. **Ogräsängd**
Liten (0-1 planta under en handflata) — 1
Mätlig — 3
Stor (minst 4 plantor under en handflata) — 5

5. **Ogräsarternas konkurrensförmåga**
Liten (mest lågvuxna arter: förgätmigej, jordök, plister, trampört, viol, våtarv) — 1
Mätlig (både lågvuxna och högvuxna arter) — 2
Stor (mest högvuxna arter: baldersbrä, dån, harkål, mälla, pilört, snärjmåra, åkerbinda) — 4

Dosnyckel

(finns även på webbutiken.jordbruksverket.se)

För att dosnyckeln ska vara användbar krävs att

- sprutan uppfyller kraven vid funktionstest.
- preparat väljs efter vilka ogräs som förekommer.

Funktionstest

De viktigaste kraven vid funktionstestet gäller vätskefördelning, omrörning, manometer och kallbrevning.

Välj preparat efter vilka ogräs som förekommer

Ogräsarterna kan bestämmas med hjälp av boken "Ogräs på åker och i trädgård", Natur och kultur, eller bildarkivet på www.jordbruksverket.se/ograsdatabas.
Anteckna ogräsarterna i växtodlingsplanen.

Val av preparat kan göras med hjälp av "Ogräsdatabasen" på www.jordbruksverket.se/ograsdatabas eller Jordbruksverkets publikation "Kemisk ogräsbekämpning";

Dosrekommendationer

På preparatets etikett anges ofta ett dosintervall. Rekommendationerna i dosnyckeln utgår från den högre dosen som normalt ger över 85 procent effekt.

Dosnyckeln rekommenderar den dos som ger en tillräckligt hög effekt för att förhindra att ogräsmängden ökar på sikt och som beräknas ge det bästa ekonomiska utbytet.

Lämnas alltid en obehandlad yta för kontroll av effekten.

Observera att tillverkarna av preparatet inte ansvarar för användning utanför etikettens rekommendationer!

Dosnyckeln har utvecklets av B. Jennéus, Jordbruksverket och G. Gummesson, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Uplaga 6, Framtagen av Jordbruksverket, Rådgivningsenheten. Tryckt 2018.
Kontakt: vaxtskydd@jordbruksverket.se

Jordbruksverket • 551 82 Jönköping • Tfn 036-15 50 00 (vx)
jordbruksverket@jordbruksverket.se
www.jordbruksverket.se

För anpassad ogräsbekämpning

DOSNYCKEL | Våräd

